

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 28-8-72 414491

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 87-18-28 - 87-18-29)
(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

ABONNEMENT ANNUEL
25 Francs

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 93, rue de Curambourg, 45-FLEURY-LES-AUBRAIS
C. C. P. : La Source 4.604-25

Supplément n° 3 au Bulletin n° 143

24 AOUT 1972

- 31 -

ARBRES FRUITIERS

POU DE SAN JOSE

Les premières larves de la deuxième génération sont apparues.

En conséquence, dans les zones intéressées, un premier traitement devra être appliqué contre cette deuxième génération dans la semaine du 28 Août au 2 Septembre. Une nouvelle application devra être effectuée deux semaines après. On pourra utiliser un produit à base d'une des matières actives suivantes : Méthidathion (40 g/hl), Oléoparathion, Parathion émulsion (25 g/hl).

Ces traitements sont obligatoires dans toutes les communes faisant partie des zones contaminées et des zones de protection qui ont été définies par l'arrêté ministériel du 4 Août 1958.

PSYLLE DU POIRIER

Afin d'éviter des infestations tardives très fréquentes en arrière saison, il y a lieu d'être attentif durant tout le mois de septembre, notamment dans les vergers où aucun traitement insecticide n'a été appliqué depuis un certain temps, afin d'intervenir le cas échéant contre ce ravageur.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Nous rappelons que dans les vergers où la maladie est présente une protection permanente des fruits doit être assurée jusqu'à la récolte et les traitements doivent être effectués en fonction du lessivage par les pluies. Ces traitements tardifs présentent l'intérêt d'être efficaces contre les maladies de conservation.

VIGNES

OIDIUM DE LA VIGNE

Nous rappelons les indications données dans nos précédents Bulletins.

L'Oïdium rencontre des conditions climatiques favorables à son développement. Des attaques parfois sévères sont observées dans les vignes insuffisamment protégées. Il convient donc d'intervenir le cas échéant.

TABAC

MILDIOU DU TABAC

Depuis notre dernier Bulletin, de nouveaux foyers ont été découverts dans les communes suivantes : SAVIGNY en VERON (37), MASLIVES (41), NOUAN sur LOIRE (41), ST CLAUDE de DIRAY (41), LAILLY en VAL (45), TRAINOU (45).

Il s'agit de petits foyers avec attaques peu virulentes sur 9 plantations dont la cueillette des feuilles basses seules atteintes est en cours.

RESULTATS DU CONCOURS POUR LA DETECTION DES FOYERS PRIMAIRES DE MILDIOU
DE LA VIGNE EN 1972

- DEPARTEMENT DE L'INDRE -

50 F : M. JUSSERAND Marcel Bois St Denis 36260 REUILLY

- DEPARTEMENT DU LOIRET -

50 F : M. JAVOY Germain MEZIERES LES CLERY 45370 CLERY ST ANDRE

30 F : M. MOULLE André 114, rue du Petit Vomimbert 45800 ST JEAN-DE-BRAYE

- DEPARTEMENT DU CHER -

50 F : M. BESSEMOULIN Joël Route de Reuilly QUINCY 18120 LURY-SUR-ARNON

30 F : M. CLAVIER Eugène Thureau à l'Oie 18510 MENETOU SALON

- DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER -

50 F : M. CHESNEAU Gilbert 41520 SAMBIN

30 F : M. TOYER Pierre "Champcol" 41130 SELLES-SUR-CHER

- DEPARTEMENT DE L'INDRE-ET-LOIRE -

50 F : M. MEUNIER Michel CANGEY 37400 AMBOISE

30 F : M. COMPAGNON Jean "Les Etangs" 37130 LANGEAIS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements
Agricoles,

G. RIBAUT
B. PACQUETEAU

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"CENTRE"

G. BENAS